

100mm X 126mm

นายวี สเปนซ์ปกป้องผิวหนึ่ง : สำหรับป้องกันและดูแลผิวหนึ่ง

นายวี สเปนซ์ปกป้องผิวหนึ่งประกอบด้วยโพลิเมอร์ที่น้ำหนักโมเลกุลสูงและตัวทำละลายที่ระเหยง่าย เมื่อพ่นผิวหนึ่งจะก่อให้เกิดฟิล์มเคลือบผิวหนึ่งที่ทนน้ำ ซึ่งฟิล์มนี้จะย่อยสลายได้ทางชีวภาพ อุดจากระเบิดสารเคมีจากแอลกอฮอล์ที่ฉีดลงแผล ซึ่งเป็นสาเหตุของแผลจากการกระแทกหรือจากสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยเฉพาะแผลในผิวหนังที่แตก หรือแผลกดทับในผู้ใหญ่ นอกจากนี้ฟิล์มยังมีคุณสมบัติกันน้ำ แต่ยอมให้ออกซิเจนผ่านเข้าสู่ผิวหนังได้ จึงช่วยลดความชื้นเกินไปและการระคายเคืองได้ดียิ่งขึ้น นายวี สเปนซ์ปกป้องผิวหนึ่งมีขนาดบางล่อนกึ่งสูงสามารถใช้ได้กับทุกวัย

แนะนำให้ใช้ในรูปแบบต่อไปนี้



ป้องกันทารกเกิดผื่นผ้าอ้อมในเด็ก หรือ ผู้ใหญ่



ปกป้องผิวจากอุจจาระ ปัสสาวะ: ลดการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยนอนติดเตียง



ป้องกันผิวในผู้ป่วยโรคเบาหวาน



ป้องกันผิวหนึ่งจากการแพ้พลาสติกในผู้ที่ทำหัตถการระบุเปิด

คุณสมบัติปกป้องผิวหนึ่งมีไว้สำหรับ:

- อุจจาระหรือปัสสาวะที่ติดอยู่บนผิว
- ข่วนแผลในร่นาบาด เช่นผ้าอ้อม หรือสิ่งกัดกร่อน
- ทางการแพทย์ใช้ทำแผล

ส่วนประกอบ: Hexamethylsiloxane Acrylates Copolymer

วิธีใช้ : สำหรับผู้ใหญ่ เด็ก และทารกที่อายุมากกว่า 1 เดือน

1. ทำความสะอาดผิวหนังก่อนนำมา ป้อนให้แห้ง
2. ฉีดพ่นและรอจนกว่า สเปนซ์ปกป้องผิวหนึ่งโดยให้ตัวฉีดแห้งจากผิวหนึ่ง 10-15 ซม. เพื่อสร้างฟิล์มเคลือบผิวหนึ่ง
3. กรณีที่ต้องการฉีดพ่นซ้ำ ต้องคอยให้ฟิล์มในครั้งแรกแห้งก่อนจึงฉีดพ่นซ้ำ
4. กรณีที่ใช้กับผิวหนังที่มีรอยแผลเป็นหรือแผล มีรอยฟกช้ำและบวมแดง และรอให้ผิวหนึ่งแห้งก่อนจึงลอกออกด้วยวิธีลอกออกตามปกติ
5. กรณีที่ใช้กับผิวหนังที่เปื้อนด้วยไขมันหรือครีมทาผิว ควรใช้ฟิล์มบนผิวหนังที่สะอาดก่อน
6. กรณีที่ต้องการใช้ซ้ำ เช่นกับผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ สเปนซ์ปกป้องผิวหนึ่ง 12-36 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปกป้องผิว

ข้อห้ามใช้ : ไม่แนะนำให้ใช้กับผิวหนังที่มีการติดเชื้อ

ข้อควรระวัง :

1. หลีกเลี่ยงการใช้ ให้อากาศหรือแสงแดดส่องถึงผิวป้องกันไม่ให้สารละลายระเหย
2. ถ้าผิวหนังแดงหรือมีอาการแพ้ให้รีบปรึกษาแพทย์
3. ไม่แนะนำให้ใช้กับแผลลึก และบริเวณที่เป็นผิวหนัง เช่น ตา หรือเยื่อ
4. ไม่ใช้กับแผลที่มีเลือดออกหรือมีน้ำเหลืองซึม
5. การฉีดพ่นที่บริเวณที่บวมหรือผิวหนังที่บวมผิวหนึ่งเช่น เล็บ ริมฝีปาก อาจจะลดประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นี้ได้

คำเตือน :

- สารละลายในผลิตภัณฑ์เป็นชนิดที่ระเหยง่ายและติดไฟได้ ควรใช้ในที่ที่มีการระบายอากาศและหลีกเลี่ยงการใช้ใกล้กับเปลวไฟ
- เก็บให้พ้นมือเด็ก
- หลีกเลี่ยงการสูดดมโดยตรง

การรักษา :

เก็บผลิตภัณฑ์นี้ให้อยู่ในอุณหภูมิห้อง และหลีกเลี่ยงแสงแดด ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้หลังจากนั้นเป็นเวลาอย่างน้อยสองสัปดาห์

ขนาดบรรจุ : ขนาด 30 มิลลิลิตร

ผลิตภัณฑ์ :

Hannox International Corp.

Alliance manufacturer:

Nanosigma Biotech, Co., Ltd.

New Taipei City, Taiwan

บริษัท :

บริษัท บิอัสซิเนส จำกัด กรุงเทพฯ โทร 02-112760

www.biz-success.com